

※配布・転載はご遠慮ください



ライチョウの識別

作成： 長野県環境保全研究所自然環境部 堀田昌伸

ライチョウ



カヤクグリ



高山帯で見られる鳥たち

ホシガラス



イワヒバリ



ライチョウの飛ぶすがた

ライチョウ



ホシガラス



目立つ風切羽と尾羽は？



♂



冬

春·初夏

晚夏·秋



♀

4月

♀

白色



4/29/2013



繁殖期、雄の背中
の体羽は黒褐色



5月

♀

繁殖期、雌の上面の羽毛は、
焦茶色、薄茶色のまだら模様



ここのまだら模様は、換羽が遅く
晩秋まで残る

5/18/2014

繁殖期、雄の背中
の体羽は黒褐色



脇の羽毛は換羽が遅く、
晩秋まで繁殖期の羽毛が残る



6月

繁殖期、雌の上面の羽毛は、
焦茶色、薄茶色のまだら模様



♀

このまだら模様は、換羽が遅く
晩秋まで残る



6/30/2009

7
月

繁殖期、雄の背中
の体羽は黒褐色



♂

7/16/2011

7月

♀

繁殖期、雌の上面の羽毛は、
焦茶色、薄茶色のまだら模様

ここのまだら模様は、換羽が遅く
晩秋まで残る

7/17/2009

雄は、ヒナが孵化するとなわばりを解消
背中の中羽は換羽し、灰褐色になる

脇の羽毛は換羽が遅く、晩秋まで
繁殖期の羽毛が残る

8月

♀

ヒナ連れ

ひな連れの雌は、換羽が遅れ、この時期でも
背中の体羽は焦茶色、うす茶色のまだら模様
少し換羽し、灰褐色の羽毛が見られる



8/27/2014

8月

♀

繁殖失敗

ヒナを連れていない雌
雄と同様に、すでに換羽が進行し、
背中への体羽が灰褐色

このまだら模様は、換羽が遅く
晩秋まで残る

8/21/2017

背中 of 体羽は換羽し、灰褐色

脇 of 羽毛は換羽が遅く、
繁殖期 of 羽毛が残る

9月

♀

ヒナ連れ

ヒナ連れの雌は、換羽が遅れ、この時期でも背中の羽毛は焦茶色、うす茶色のまだら模様
少し換羽も見られ、灰褐色の羽毛も見られる

このまだら模様は、換羽が遅く
晩秋まで残る

9/16/2015

10
月

♂

背中 of 体羽は換羽し、灰褐色

脇 of 羽毛は換羽が遅く、
繁殖期 of 羽毛が残る

10/19/2012



10
月

背中
の
体羽
は
換羽
し、
灰
褐
色



脇
の
羽
毛
は
換
羽
が
遅
く、
繁
殖
期
の
羽
毛
が
残
る



♀

10/19/2012

11月

♂

黑色



11/3/2017



11月

♀

白色



11/3/2017



生活痕跡（糞・砂浴び跡・足跡）

